


Messprotokoll tcpO ₂			> 50	mmHg	Normal
Vorname			50 - 35	mmHg	leicht vermindert
Nachname			35 - 30	mmHg	Mäßig vermindert
Geschlecht			< 30	mmHg	kritisch
Geb. Datum			< 20	mmHg	Schwere Ischämie
Patienten Nr.			< 10	mmHg	Anoxisch

Raucher ☐ ja ☐ nein	Diabetiker ☐ ja ☐ nein	Hypertoniker ☐ ja ☐ nein	Neuropathie ☐ ja ☐ nein
Stk. Pro Tag	Insulin ☐ ja ☐ nein	Eingestellt ☐ ja ☐ nein	

Sondenposition	Sonde	Stabilwert	Lageänderung	O ₂ Inhalation	Andere
	1	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	2	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	3	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	4	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	5	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	6	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	7	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	8	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
	Regionaler Perfusions Index				
	Fuß		Brust		
	Stabilwert		Stabilwert		
	mmHg		mmHg		
	Abweichung		Fuß/Brust = %		
< 0,4 ungünstige Prognose > 0,6 günstige Prognose 0,4 - 0,6 neutral					

Bein	Wunde	Seit wann	Schweregrad	Gehschmerz	Ruheschmerz	Spürbarer Puls
rechts	☐ ja ☐ nein		1 2 3 4 5 6	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
links	☐ ja ☐ nein		1 2 3 4 5 6	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

Datum	Klinik	Abteilung	Anwender	Nächste Messung	Bemerkungen